

十一、臺灣藥樹椿象類

| 藥劑名稱 | 每公頃每 次施藥量 | 稀釋倍數 (倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--|---------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 25%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos) | 0.6-1.5 公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 50%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.3-0.8 公升 | 1,800 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 50%陶斯松 可濕性粉劑* (Chlorpyrifos) | 0.3-0.8 公斤 | 1,800 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 22.5%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.6-1.5 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 40.8%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 40.8%陶斯松 水基乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 75%陶斯松 水分散性粒劑* (Chlorpyrifos) | 0.2-0.4 公斤 | 3,500 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 16%可尼丁 水溶性粒劑* (Clothianidin) | 0.2-0.5 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 20%免扶克乳劑* (Benfuracarb) | 0.8-1.9 公升 | 800 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 25%免扶克 可濕性粉劑* (Benfuracarb) | 0.6-1.5 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 40%免扶克水懸劑* (Benfuracarb) | 0.4-0.9 公升 | 1,600 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 1%賽洛寧 可濕性粉劑* (lambda- Cyhalothrin) | 0.9-2.1 公斤 | 700 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 5%賽洛寧 水分散性粒劑* (lambda- Cyhalothrin) | 0.2-0.4 公斤 | 3,500 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |

| 藥劑名稱 | 每公頃每 次施藥量 | 稀釋倍數 (倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---|---------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda- Cyhalothrin) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 48.34%丁基加保扶 乳劑* (Carbosufan) | 0.6-1.5 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 48.34%丁基加保扶 水基乳劑* (Carbosufan) | 0.6-1.5 公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 25%丁基加保扶 可濕性粉劑* (Carbosufan) | 0.8-2 公斤 | 750 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 40%丁基加保扶 可濕性粉劑* (Carbosufan) | 0.5-1.3 公斤 | 1,200 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 10%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam) | 0.2-0.5 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 25%賽速安 水溶性粒劑* (Thiamethoxam) | 0.1-0.2 公斤 | 7,500 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 20%亞滅培 水溶性粉劑* (Acetamiprid) | 0.2-0.4 公斤 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 10%氟尼胺 水分散性粒劑* (Flonicamid) | 0.2-0.5 公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | |
| 9.6%益達胺 水懸劑* (Imidacloprid) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 9.6%益達胺溶液* (Imidacloprid) | 0.3-0.8 公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|
| 18.2%益達胺水懸劑* (Imidacloprid) | 0.2-0.5 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |
| 28.8%益達胺溶液* (Imidacloprid) | 0.1-0.3 公升 | 6,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 避免於開花期使用。 |

*延伸使用藥劑

TACTRI